

Effets indésirables possibles associés aux inhibiteurs d’ALK

Comme tout autre traitement, les inhibiteurs d’ALK peuvent entraîner des effets indésirables. Pour les reconnaître, il faut avant tout en avoir conscience. Les effets indésirables peuvent être légers ou modérés et peuvent affecter vos activités quotidiennes. Des effets indésirables graves sont possibles¹ , mais votre équipe soignante vous surveillera de près et pourra vous conseiller sur les symptômes à surveiller. Les effets indésirables peuvent varier d’un inhibiteur d’ALK à l’autre. Certains peuvent survenir avec plusieurs médicaments de cette classe, tandis que d’autres peuvent être plus spécifiques au médicament que vous prenez.^{2,3} Vous trouverez ci-dessous une description de certains effets indésirables possibles associés aux inhibiteurs d’ALK :



- Toux
- Essoufflement/dyspnée
- Pneumopathie




- Ralentissement du rythme cardiaque / bradycardie
- Hypertension



- Éruption cutanée
- Photosensibilité
- Démangeaisons



- Effets sur les fonctions cognitives et l’humeur
 - Problèmes de mémoire
 - Sautes d’humeur
 - Confusion
 - Hallucinations




- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée
- Constipation



- Anémie
- Diminution du nombre de globules blancs
- Hyperglycémie
- Taux élevé de lipides sanguins



- Lésions hépatiques



- Vision trouble
- Vision double
- Perte de la vue
- Éclairs lumineux

Chez certaines personnes, les effets indésirables peuvent persister au cours des premières phases du traitement. Chez d’autres, ils peuvent durer tout au long du traitement. Si certaines personnes ne ressentent aucun effet indésirable liés aux inhibiteurs d’ALK, beaucoup d’autres en souffrent. Si vous ressentez des effets indésirables liés au traitement par inhibiteurs d’ALK, parlez-en à votre médecin. En cas d’effets indésirables graves, rendez-vous immédiatement aux urgences. En cas de doute sur un symptôme, consultez un médecin. Informez toujours l’équipe soignante que vous suivez un traitement par inhibiteurs d’ALK pour un cancer du poumon ALK+.

Votre médecin pourra ajuster la posologie de votre traitement, généralement en réduisant la dose. La réduction de la dose n’est pas rare dans le cadre d’un traitement anticancéreux. Votre médecin ajustera la posologie selon les besoins.

References
1. Pfizer Limited. Lorviqua 100 mg film-coated tablets: Summary of Product Characteristics (SmPC). Updated 7 July 2026.
2. Luo, Y et al. Lung Cancer. 2023;184:107319;
3. Liao D, Zhang J, Yan T, et al. OncoTargets Ther. 2023;16:731–738.