

Posibles efectos secundarios de los inhibidores de ALK

Al igual que cualquier otro tratamiento, los inhibidores de ALK pueden provocar efectos secundarios. Para reconocer estos efectos secundarios, lo primero es estar informado. Los efectos secundarios pueden ser leves o moderados y pueden afectar a las actividades cotidianas. Es posible que se produzcan efectos secundarios graves¹, pero su equipo sanitario le hará un seguimiento exhaustivo y le aconsejará sobre los síntomas a los que debe prestar atención. Los efectos secundarios pueden variar según el inhibidor de ALK. Algunos pueden producirse con varios medicamentos de esta clase, mientras que otros pueden ser más específicos del medicamento que esté tomando.^{2,3} A continuación se describen algunos posibles efectos secundarios de los inhibidores de ALK:



- Tos
- Dificultad para respirar/ disnea
- Neumonitis




- Frecuencia cardíaca baja/bradicardia
- Hipertensión



- Erupción cutánea
- Fotosensibilidad
- Picor



- Efectos cognitivos y sobre el estado de ánimo
 - Problemas de memoria
 - Cambios de humor
 - Confusión
 - Alucinaciones



- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Estreñimiento



- Anemia
- Disminución del recuento de glóbulos blancos
- Nivel elevado de azúcar en sangre
- Niveles elevados de lípidos en sangre



- Lesión hepática



- Visión borrosa
- Visión doble
- Pérdida de visión
- Destellos de luz

En algunas personas, los efectos secundarios pueden persistir durante las primeras fases del tratamiento. En otras, los efectos secundarios podrían durar todo el tratamiento. Aunque algunas personas no experimentan ningún efecto secundario de los inhibidores de ALK, muchas otras sí los padecen. Si experimenta algún efecto secundario derivado del tratamiento con inhibidores de ALK, hable con su médico. Si experimenta efectos secundarios graves, acuda inmediatamente a un servicio de urgencias. Si tiene dudas sobre cualquier síntoma, busque atención médica. Informe siempre al equipo médico de que está siendo tratado con inhibidores de ALK para el cáncer de pulmón ALK+.

Es posible que su médico ajuste la dosis de la medicación, normalmente reduciéndola. La reducción de la dosis no es infrecuente en el tratamiento del cáncer. Su médico ajustará la dosis según sea necesario.

Referencias

1. Pfizer Limited. Lorviqua 100 mg, comprimidos recubiertos con película: Resumen de las características del producto (RCP). Actualizado el 7 de julio de 2026.

2. Luo, Y et al. Lung Cancer. 2023;184:107319;

3. Liao D, Zhang J, Yan T, et al. OncoTargets Ther. 2023;16:731–738.